

京大病院医療安全情報 133

【ムーベン飲用方法の誤解】

事例1

80歳代の患者。病棟看護師は2Lの容器がないため、その都度コップで薄めて提供することとした。患者が飲みきった頃に病室へ行き、3杯目まで作成した。4杯目を作成しようと訪室したところ、ムーベン原液が約150ml減っていた。患者自身が原液をコップに注ぎ、薄めずに飲んでしまっていた。

事例2

40歳代の患者。病棟看護師はムーベンを希釈後患者に渡した。約3時間後、全量2Lのうち300ml程度しか飲めていなかったことが発覚。患者はムーベンを自分で薄めて飲む必要があると思い、さらに4倍希釈して飲んでいた。

事例3

80歳代の患者。看護師が患者に2Lの水の用意があるか質問したところ、患者から「病院の水道水は飲用可能か」と聞かれたため、可能と答えた。患者は「飲み方を理解している」と答えた（3日前にもムーベンを飲用）。約10分後にナースコールがあり、再び「水道水の飲用は可能か」と聞かれたため、看護師は可能と説明し飲用方法について説明した。約90分後、ムーベンを飲みはじめていなかったことが発覚した。

➡ 3日前は看護師が2Lに薄めたムーベンを手渡した。今回別の看護師が対応し、その都度患者が薄める方法で説明していた。患者は、1.5Lの水道水を持ってきてくれると思い、飲み始めずに待っていた。

インシデント報告に基づいた対策です

京大病院医療安全情報 133

【入院中は、うすめてからムーベンを渡します】

■ムーベコ 配合内用液 のうすめ方

■全量が2Lになるよううすめる方法

ムーベコ配合内用液は“濃厚原液”です。必ず水で4倍にうすめてください。

① ムーベコ濃厚原液全量(500mL)を2L入る容器に移し替え、水で全量が2Lになるよううすめ振り混ぜてください。




専用容器を使います



水で全量が2Lになるよううすめ振り混ぜます。



約180mlのうすめた薬液をコップに移してください。



180ml

目盛り付きディスボカップを使います
・看護師は、1杯(180ml)の部分に線を引いてから、患者に渡します。

詳細は以下にあります、印刷してお使いください

共有フォルダ>内視鏡室(Ns用)>最新版>下部内視鏡検査
>ムーベンを服用される入院患者さんへ・病棟看護師用ムーベコ資料

2022年3月1日から中止します。
・薬剤部が調剤時に付けている説明用紙配布

※若い方・慣れている方は、ムーベコ付属コップを使って、1杯毎にうすめる方法で飲むことも可能です。



■ムーベコ 配合内用液 のうすめ方

■付属コップを使って1杯毎にうすめる方法

ムーベコ配合内用液は“濃厚原液”です。必ず水で4倍にうすめてください。

① ムーベコ濃厚原液を付属コップの下の赤い線まで原液を



下の赤い線まで原液を入れる

② 次にコップの上の青い線(約180mL)までゆっくりと水を注いでうすめてください。



上の青い線まで水でうすめる



医療安全管理室作成